

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik der Charité Berlin
(Geheimrat Prof. Dr. Sauerbruch)

Die chirurgisch - konservative Behandlung
der Röhrenknochen - Sarkome

Inaugural - Dissertation

zur

Erlangung der

Medizinischen Doktorwürde

an der

Friedrich - Wilhelms - Universität

zu Berlin

vorgelegt von

JUTTA STRUNK GEB. SCHATZ

Berlin

15. September 1934

Gedruckt mit Genehmigung
der
Medizinischen Fakultät der Universität Berlin

Dekan : Professor Dr. Gocht

Referent : Professor Dr. Nissen

Korreferent : Geheimrat Professor Dr. Sauerbruch



**DIE
CHIRURGISCH-KONSERVATIVE
BEHANDLUNG DER
RÖHRENKNOCHEN - SARKOME.**



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Unter den Sarkomen der Gliedmaßen spielen die der Knochen und unter ihnen wieder die der langen Röhrenknochen die wichtigste Rolle. Das Sarkom der langen Röhrenknochen ist eine der häufigsten Sarkomformen überhaupt. Es bevorzugt das jugendliche Alter, nach dem 40. Lebensjahr wird es seltener. Die langen Röhrenknochen des Beines werden gern befallen. Obenan steht der Femur, dann folgt die Tibia, der Humerus, die Fibula, der Radius und die Ulna. Ausgangspunkt ist in erster Linie die Metaphyse, und zwar am häufigsten die untere Metaphyse des Femur und die obere der Tibia. Das Trauma scheint dabei eine gewisse Rolle zu spielen.

Nach dem Ursprungsgewebe unterscheidet man zwischen myelogenem und periostalem oder zentralem und peripherem Knochen Sarkom. Diese beiden Gruppen weisen sowohl klinische Verschiedenheiten auf, als sie auch in der Prognose stark voneinander abweichen. Schon äußerlich zeigen diese beiden Formen erhebliche Abweichungen. Beim zentralen Ursprung des Tumors ist das Wachstum ein langsames, da ein starker Widerstand zu überwinden ist. Der Zerstörung des Knochens von innen tritt eine periostale Neubildung von außen entgegen. Letztere tritt jedoch gegenüber der Aufzehrung des Knochens von innen zurück, so daß die äußere Knochenhülle immer dünner wird und schon bei mäßiger Gewalteinwirkung eine Spontanfraktur eintritt. Das periphere Sarkom sitzt dem Knochen auf und zeigt daher ein unregelmäßiges und unförmiges Aussehen. Nach dem Durchbruch dieser Sarkomform in die Markhöhle und dem Übergriff des zentralen auf die äußeren Weichteile sind die beiden Arten nicht mehr sicher voneinander zu unterscheiden.

Besonders zu erwähnen ist das sogenannte zentrale schalige Knochen Sarkom, das gewöhnlich ein Riesenzellsarkom darstellt.

Sehr frühzeitig pflegt das Knochen Sarkom zu metastasieren. Metastasen sind öfters an anderen Skelettteilen, besonders häufig jedoch in der Lunge beobachtet worden. Anscheinend spielt dabei der Blutweg die Hauptrolle. Eine metastatische Erkrankung der zugehörigen Lymphknoten hat man nur in einer geringen Zahl von Fällen feststellen können.

Als klinische Symptome treten bei den Sarkomen manchmal Fieber und Schmerzen auf. Der Allgemeinzustand des Kranken ist ganz gut. Die Zeichen der Kachexie, wie man sie beim Carcinom regelmäßig findet, sind meistens, auch in vorgeschrittenen Fällen, nicht vorhanden.

Die Diagnose ist häufig nicht sehr einfach, vor allem im Frühstadium, wo deutlich sicht- und tastbare Veränderungen fehlen. Manchmal verfälscht auch das Röntgenbild, das selbst im späteren Stadium schwer zu deuten ist.

Differentialdiagnostisch kommen fast alle in der Umgebung der Knochen sich abspielenden Krankheitsprozesse in Betracht. Eine für das Knochenfarkom typische Veränderung im Röntgenbild ist die unscharfe Begrenzung des Tumorschattens gegen die Weichteile und die deutlichen Veränderungen der eigentlichen Knochensubstanz an der Basis oder der Umrandung des Tumors. Auch der Nachweis einer keilförmigen Osteophytenbildung an der Stelle, wo der Umriss des Tumorschattens mit dem Knochen Schatten zusammenstößt, ist für das Sarkom im Röntgenbild bezeichnend. Die Osteome und Exostosen lassen sich differentialdiagnostisch durch das Vorhandensein einer normalen Knochenstruktur unschwer ermöglichen. Die Chondrome bereiten in vielen Fällen größere differentialdiagnostische Schwierigkeiten. Sie können manchmal das Knochengewebe, dem sie aufliegen, zerstören, doch geschieht dies selten in dem Maße, wie bei den echten Sarkomen.

Erwähnt seien auch die Myositis ossificans, die Ostitis fibrosa, der Echinococcus und das Myelom, Krankheitsbilder, die differentialdiagnostisch gegenüber dem Sarkom in Frage kommen. Wichtiger ist jedoch die Differentialdiagnose des zentralen Knochenfarkoms gegen die Knochenzysten; denn sie haben eine Reihe klinischer Eigenschaften mit dem Sarkom gemeinsam. Für die Unterscheidung spielt der Röntgenbefund die wichtigste Rolle. Ebenso können die kretischen Knochenveränderungen, vor allem die gummiöse Osteomyelitis, die Ostitis und Periostitis bei der Diagnosenstellung erhebliche Schwierigkeiten machen.

Für die Tuberkulose des Knochens ist typisch, daß das Gelenk frühzeitig in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch die fehlende oder nur sehr geringe Beteiligung des Periosts am Entzündungsvorgang ist für die Tuberkulose kennzeichnend. Zuletzt kann die Osteomyelitis, und zwar die nicht eitrige, chronisch-sklerotisierende, manchmal mit dem Sarkom verwechselt werden.

Als letztes diagnostisches Mittel kommt die operative Freilegung und Probeexcision in Frage. Der Ausfall der histologischen Untersuchung ist wichtig für die Prognose und die Behandlung der Sarkome.

Die Behandlung des Sarkoms der langen Röhrenknochen ist in erster Linie eine operative. Ausgehend von dem Wunsch, den Tumor völlig im Gefunden zu entfernen, wird von vielen Autoren seit langem die Amputation oder Exartikulation des befallenen Gliedes empfohlen. Die relative Gutartigkeit der Zentralriesenzellensarkome war für viele Autoren die Veranlassung, diese Tumoren mit weniger eingreifenden Operationen anzugehen. Durch den Fortschritt der Chirurgie auf dem Gebiet der Knochentransplantation ist man weiterhin auf den Gedanken gekommen, auch bösartige Sarkomformen mit weniger eingreifenden Verfahren zu behandeln.

Unsere Arbeit soll sich im wesentlichen mit dem konservativ-chirurgischen Verfahren der Behandlung des Sarkoms beschäftigen. Schon ältere Chirurgen, wie v. Bergmann (1891) und zwei Jahre später v. Bramann haben Fälle mitgeteilt, in denen die Resektion des erkrankten Knochenstückes gute Resultate ergeben hat. Derjenige, der zuerst dieses Verfahren als das der Wahl aufgestellt hat, war v. Miculicz, und es sind von ihm im Jahre 1895 mehrere Fälle veröffentlicht worden, die die Berechtigung der konservativ-chirurgischen Behandlung erwiesen haben.

Seither sind viele Autoren seinem Beispiele gefolgt, und auch an unserer Klinik beschränkt sich die Therapie der Knochen Sarkome vielfach auf dieses Verfahren.

Wir sind in der Lage, aus den letzten 5 Jahren die Krankengeschichten einiger Patienten zu veröffentlichen, bei denen die Behandlung nach dem konservativen Verfahren angewandt wurde.

E. R. 19 jährige Kraftwagenführersfrau, aufgenommen am
3. 2. 30.

Anamnese: Früher niemals ernstlich krank gewesen. Während einer Schwangerschaft bekam die Pat. Schmerzen in der rechten Hüfte und im rechten Kniegelenk. Nach der Entbindung im September 1929 bemerkte sie, daß der rechte Oberschenkel dicker wurde. Schmerzhaftigkeit bestand nicht. Eine Punktion auf der Höhe der Anschwellung ergab eine dunkelgelbe Flüssigkeit mit bräunlichen Flocken. Die Kranke wurde zur Weiterbehandlung der Charité überwiesen.

Befund: In gutem Ernährungszustand. Innere Organe o. B.

Lokalbefund: Die obere Hälfte des rechten Oberschenkels ist allseitig verdickt. Bei der Palpation fühlt man direkt unterhalb des Trochanter, hauptsächlich gegen die Medialseite entwickelt, einen etwa mannsfaustgroßen, annähernd runden harten Tumor, der mit dem Knochen fest verwachsen zu sein scheint. Die Haut darüber ist unverändert. Kein Druckschmerz, Muskulatur nicht atrophisch, keine Sensibilitätsstörung. Beweglichkeit im Hüftgelenk schmerzlos, frei.

Diagnose: Sarkom des Oberschenkels.

Operation: 10. 2. 30. Oberarzt Niffen — Lachgasnarkose.

Längsschnitt am rechten Oberschenkel, Eingehen lateral vom M. rectus femoris. Nachdem der Muskeltumpf auseinandergeschoben ist, kommt man auf eine harte Geschwulstkapsel, die wenige Millimeter dick ist. Sie ist außen von derbem Bindegewebe überzogen, daß sich leicht abstreifen läßt. Die Geschwulst geht vom Knochen aus, hat eine dünne knöcherne Wand, ist halbkuglig, über zweimannsfaultgroß. Nach Aufmeißelung der Knochenschale kommt man in eine große mehrkammerige Höhle. Im Innern der zweimannsfaultgroßen Geschwulst befindet sich eine gelbrote Flüssigkeit. Auf die Muskulatur scheint der Tumor nicht überzugreifen. Es werden vom Innern der Tumorwand einige Stücke exidiert und sofort mikroskopisch untersucht. Diagnose: Sarkom. Der Tumor wird nun allseitig zunächst gegen den oberen Pohl, dann am unteren Pohl des Femur freigelegt und mit samt dem Femurabschnitt in toto und dem Meißel reseziert. Nun wird ein gleichlanger Knochen-span aus der Vorderfläche der rechten Tibia in die beiden Femurenden eingeklebt. Sorgfältige Blutstillung. Naht. Beckengipsverband.

14. 5. 30: Anlegen eines neuen Beckengipsverbandes.

Röntgenaufnahme: Gute Stellung, fortschreitende Knochenbildung von den Enden des Spans her.

16. 5. 30: Pat. wird nach Hause entlassen.

1. 8. 30: Wiederaufnahme zur Erneuerung des Gipsverbandes. Befund: Die Beweglichkeit an der Refektionsstelle ist vorhanden, jedoch hat der Span soviel Festigkeit gewonnen, daß man einen leichten Zug ausüben kann, ohne ihn aus den Lagern zu ziehen. Neuanlegen eines Gipsverbandes und Entlassung am 16. 8. 30.
3. 11. 30: Wiederaufnahme. Abnahme des Gipsverbandes. Massage und Bewegung in den Gelenken. Gehbewegung mit dem Oberschenkelstützapparat.
16. 12. 30. Starke Schmerzen im rechten Hüftgelenk nach der Gehbewegung. Durch Röntgenaufnahme Fraktur am proximalen Spanende festgestellt.
20. 12. 30: Erneute Operation — Prof. Nissen. Längsschnitt in der alten äußeren Narbe. Nach scharfer Durchtrennung der Haut, des Fettgewebes und der Muskulatur gelangt man in die Gelenkgegend. Nach vorsichtigem Abpräparieren des Spanes von den Verwachsungen stellt sich am proximalen Ende eine Fraktur ohne Dislokation heraus. Deswegen wird aus der rechten Fibula ein neuer Span in Länge des alten entnommen, der an dem alten Einpflanzungspan angelegt und mit Seidennähten fixiert wird, nachdem sowohl im Femur, wie in dem Trochanter ein breites mit dem Meißel hergestelltes Lager für ihn bereitet ist. Anlegen eines Gipsverbandes in Abduktionsstellung.
2. 1. 31: Entfernen des Gipsverbandes und Anlegung eines neuen. Das Röntgenbild zeigt, daß sich sowohl an den Einpflanzungsstellen des alten, wie auch des neuen Spans gute Callusmassen bilden.
5. 2. 31: Entlassung nach Hause.
18. 2. 31: Wiederaufnahme. Anlegen eines neuen Gehgipsverbandes.
5. 10. 31: Wiederaufnahme. Kleine Fistel in der Narbe. Röntgenbefund: Zunehmende Kalkeinlagerung im Bereiche der beiden Stümpfe. Auskratzen der Fistel.
27. 10. 31. Entlassung nach Hause mit Gehapparat mit Tuberstütze.
- 4.-7. 5. 32: Wiederum i. d. Klinik z. Nachuntersuchung u. Kontrolle. Die Kranke ist völlig beschwerdefrei. Prothese sitzt gut, in ihr wird das Bein vollständig belastet. Örtlicher Befund: Klinisch unverändert, alle Bewegungen um gut $\frac{1}{3}$ eingeschränkt, besonders die Abduktion des Beines. Es wird der Kranken geraten, den Gehapparat vorläufig weiter zu tragen.
- Röntgenbefund: Zustand nach Exstirpation eines Sarkoms, im Bereich des oberen Drittels des rechten Femur. Verheilung beider Refektionsstellen mit Tibiaspan. Coxa-vara-Stellung. Offenbar stark kallöse Verheilung. Die eingepflanzten Späne sind als solche nicht mehr sichtbar.

M. B. 26jährige Hausgehilfin, aufgenommen am 19. 11. 31., zurzeit noch in stationärer Behandlung der Klinik.

Anamnese: Außer einer Lungenentzündung früher niemals ernste Krankheiten durchgemacht. 2 Jahre vor dem Eintritt in die Klinik Sturz auf das rechte Bein. Seither Unsicherheit beim Gehen. Im Laufe des letzten halben Jahres verstärkte sich diese Unsicherheit. Infolgedessen stürzte die Kranke häufig. Vor einigen Wochen hatte sie wiederum einmal das Gefühl, als kippe sie im Knie um, ohne wirklich zu fallen. Dabei trat sofort ein starker Schmerz auf der Innenseite der rechten Kniescheibe auf, der Oberschenkel schwellte stark an. Die Anschwellung ging nach einigen Tagen zurück, an der Innenseite des rechten Beines dicht über dem Kniegelenk blieb ein harter druckempfindlicher Tumor zurück.

Im letzten Jahre Gewichtsabnahme.

Befund bei der Aufnahme: Kräftig gebautes junges Mädchen im gutem E. Z. Innere Organe ohne krankhaften Befund.

Nervensystem o. B.

Lokalbefund: An der Innenseite des rechten Beines, dicht über dem Kniegelenk, ein harter druckempfindlicher Tumor von Übermannsfaustgröße. Der Tumor ist gegen die Umgebung nicht scharf abgrenzbar, anscheinend mit dem Knochen in festem Zusammenhang. Haut gut verschieblich und unverändert. Muskulatur des rechten Oberschenkels schlaff. Patella frei beweglich. Beugung im Kniegelenk bis zu 80 Grad, Streckung bis 160 Grad.

Röntgenbefund: Tumor oberhalb des Condylus medialis des rechten Femur, scharf umgrenzt mit großbläsigen Hohlräumen.

Diagnose: Myelogenes Sarkom.

Operation: Am 9. 12. 31. (Prof. Nissen) — Lachgasnarkose.

Bogenförmige Umschneidung der Tuberositas tibiae nach Textor. Eröffnung des Gelenks. Hochpräparieren eines Hautmuskellappens, der auch die Patella enthält. Skelettierung des unteren Femurteiles. Dabei zeigt sich, daß der Tumor noch nicht in die Weichteile durchgebrochen ist, insbesondere sich die Gefäße mühelos stumpf abschieben lassen. Nachdem der Tumor vollständig isoliert ist, wird das untere Drittel des Femur abgefägt. Dann wird mit einer Bogenfäße in einer Ausdehnung von etwa 10 cm die Tibia in der Längsrichtung durchfägt. Das herausgefägte vordere Stück wird als Transplantat in das Femur eingepflanzt, und zwar so, daß der distale Teil des Tibiatransplantates in den Femurstumpf hineingeschlagen wird. Es gelingt dies insofern sehr gut, als das Transplantat fest im Femur steckt. Es wird nunmehr das Transplantat im Bereich des Knie-

gelenkes befestigt, indem die noch vorhandenen Kreuzbandreste durch Seidenknopfnähte miteinander vernäht werden, und seitlich ebenfalls die Kapfel durch Seidenknopfnähte wieder vereinigt wird. Die Blutung nach Abnehmen der Blutleerenbinde ist sehr mäßig, so daß nun der Hautweichteillappen zurückgeklappt werden kann. Subcutannähte, Hautnaht, Beckengipsverband.

23. I. 32.: Röntgenaufnahme: Status nach Osteotomie. In der ventrodorsalen Aufnahme leichter Knick nach innen. In der seitlichen Aufnahme deutlich antecourviert und geringe Verkürzung. Röntgenbefund: 13. 2. 32. Einkeilung des unteren Fragmentes des rechten Femur in das obere. Stellung gut.

1. 4. 32.: Entfernung des Gipsverbandes.

Seither Elektrifizieren, Massage, Bewegungsübungen. Nach 3 Wochen Beweglichkeit im Hüftgelenk sehr gut, im Kniegelenk noch gering. Röntgenbefund: 23. 4. 32: Starke Recourvation, keine Callusbildung.

10. 5. 32.: Beweglichkeit im Kniegelenk bedeutend gebessert. Gewichtszunahme, gutes Allgemeinbefinden.

L. H. G. 6jähriges Malerskind — Humerus Sa. links.

Aufgenommen am 16. 12. 29., entlassen 6. 3. 30.

Anamnese: Stammt aus gesunder Familie.

Januar 1929 Bruch des linken Oberarms. Etwa 3 Wochen später Druckempfindlichkeit und Schwellung in der linken Achselhöhle. Auslöfflung von weichen Tumormassen aus der Achselhöhle.

Histologischer Befund: Rundzellen Sarkom.

Danach 8 Röntgenbestrahlungen.

Im November Schmerzen in der alten Operationsnarbe, Besserung nach feuchten Umschlägen.

15. 12.: Fall und Stoß an dem linken Arm. Danach verspürte der Kranke sehr heftige Schmerzen, deshalb Aufnahme in die Klinik. Befund: Seinem Alter entsprechend gut entwickelter Junge.

Innere Organe o. B. Schwellung des linken Schultergelenkes, keine Rötung, keine Fluktuation. Starke Druckschmerzhaftigkeit des oberen Humerusdrittels und Anschwellung desselben.

18. 12.: Probeexcision.

Histologischer Befund: Polymorphes Zylinder Sarkom.

23. 12.: Operation (Prof. Nissen).

Resektion des Humerus und Ausfüllung des Defektes mit einem Span aus der linken Fibula.

Guter Wundverlauf im Gipsverband.

6. 3. 30.: Entlassung mit Schienenhülsen - Apparat.

Kind ist ambulant verstorben.

K. B. 31 jähriger Werkzeugmacher, aufgenommen am 28. 12. 31.,
entlassen am 7. 1. 32.

Anamnese: Außer den Kinderkrankheiten keine besonderen Erkrankungen durchgemacht. 6 Wochen vor der Aufnahme in die Klinik plötzlich mit Schmerzen am linken Schlüsselbein erwacht. Die Schmerzen wurden allmählich so unerträglich, daß der Kranke sich entschloß, einen Arzt zu Rate zu ziehen, der ihn unserer Klinik überwies.

Befund bei der Aufnahme: Kräftig gebauter Mann. Innere Organe o.B.

Lokalbefund: In der Mitte der linken Clavicula eine kirschgroße, harte, sehr druckschmerzhaftige Geschwulst. Die Haut darüber verschieblich und unverändert. Geschwulst mit dem Knochen der Clavicula fest verwachsen.

Diagnose: Sarkom der Clavicula.

Operation: am 30. 12. 31.

Freilegung der Clavicula. Dabei zeigt sich, daß der Tumor mit der Umgebung verwachsen ist. Resektion des tumortragenden Teiles der Clavicula 1 cm vom Sternoclaviculargelenk und 1 cm vom Acromioclaviculargelenk entfernt. Glatter Heilverlauf.

10 Tage nach der Operation entlassen.

Röntgennachbestrahlung.

K. H. 13 jähriger Schüler aus Brandenburg (Havel).

Sa. des rechten Femur.

1927 Oberschenkelresektion des unteren Drittels mit Fibulaimplantation. Pat. liegt im Gipsverband.

4. 1. 28.: Entlassung.

Nach 3 Wochen wieder Schmerzen im rechten Oberschenkel.

Infraktion der implantierten Fibula.

17. 2. 28.: Operation — Umkippplastik (Geh. Sauerbruch).

Hautschnitt an der Außenseite des rechten Femur vom Trochanter bis zum Kniegelenk. Freilegung des gesamten Femur. Exartikulation des oberen Femurendes. Weiterführen des Hautschnittes bis zum Fußgelenk. Absetzung des Fußes handbreit oberhalb des Fußgelenkes. Skelettierung des distalen Endes. Drehung der Tibia um 180 Grad. Einpflanzung des distalen Endes der Tibia in die Gelenkpfanne.

Eingriff gut überstanden. Am nächsten Tag Verschlechterung des Zustandes.

18. 2. 28.: Exitus letalis durch Fettembolie beider Lungen.

E. K. 22 jährige Verkäuferin. — *Sa. tibiae dextrae.*

Aufgenommen am 16. 4. 29., entlassen am 22. 6. 29.

Anamnese: Die Kranke stammt aus guter Familie. Mit 12 Jahren Schmerzen in der rechten Wade. Auftreten einer Schwellung. Operation — (Auskratzen eines Tumors mit scharfem Löffel) — und Gipsverband. Danach Heilung. 2 Jahre später wiederum Schwellung. Operation — (Entfernung einer Neubildung), — Gipsverband. 1928 an derselben Stelle Entstehen einer Geschwulst, die langsam wuchs. Keine Schmerzhaftigkeit.

Befund: Für ihr Alter gut entwickeltes Mädchen in genügendem Ernährungs- und Kräftezustand. Am rechten Unterschenkel, vier Querfinger unterhalb des Kniegelenkes, ein 5 Markstück großes Geschwür. Die Tibia ist im Bereich des Geschwürs aufgetrieben und hochgradig druckempfindlich.

23. 4.: Operation (Oberarzt Dr. Krampf).

Aufmeißelung der Tibia. Excochleation eines derben homogenen Tumors.

Histologische Untersuchung: Fibrosarkom.

11. 5.: Nochmalige Operation. Typische Amputation des rechten Oberschenkels handbreit oberhalb des Kniegelenks. Komplikationsloser Verlauf.

Pat. wird am 22. 6. 29. mit Oberschenkelprothese entlassen.

K. R. 10 jähriges Rechtsanwaltskind. —

Tumor regionis humeri sin. (Osteosa).

Aufgenommen am 29. 11. 29., gestorben 10. 4. 30.

Anamnese: Das Kind stammt von gefunden Eltern, machte mit 4 Jahren Scharlach, mit 8 Jahren Ruhr durch. Oktober 1929 beim Geigenspiel eine leichte Schwäche im linken Oberarm bemerkt, seitdem zunehmende Ermüdbarkeit des linken Armes, abwärts auftretende Anschwellung der linken Schultergegend. Nach Höhenfonnebestrahlung und Diathermie keine Besserung. Weiteres Zunehmen der Schwellung der Schultergegend.

Befund: Kräftig gebauter Junge. Innere Organe o. B.

An der linken Schulter im Bereich des *M. deltoideus* Tumor mit glatter Oberfläche und guter Konsistenz. Haut darüber leicht gespannt, verschieblich und von Gefäßzeichnung durchsetzt. Keine Druckschmerzhaftigkeit. Aktive und passive Bewegungen im linken Schultergelenk stark beeinträchtigt.

Röntgenbefund: Unregelmäßige Verdichtung der Knochenkonstrukturen des linken Oberarmhalses mit unregelmäßiger Aufhellung

in der Gegend des tuberculum majus. Weichteilschwellung mit unregelmäßigen Kalkeinlagerungen. Osteoidfarkom.

Keine Lungenmetafastasen.

4. 12.: Umkipplastik (Geh. Sauerbruch).

Stumpfes Abpräparieren der Oberarmmuskulatur vom Knochen, Freilegung des Schultergelenkes, Auslösen des Oberarmkopfes aus dem Gelenk. Schnittverlängerung bis zum Handgelenk. Refektion des Humerus. Hinaufkippen des Unterarms in die Oberarmwunde. Zunächst guter Heilverlauf.

Ende Januar 1930 entlassen.

27. 3. 30.: Wiederaufnahme. Bildung eines Rezidivs von Mannskopfgröße über dem Schulterblatt. Röntgenbestrahlung. Weiteres Wachsen des Rezidivs.

10. 4. 30.: Plötzlich eintretender Exitus letalis.

Die meisten Metastasen nach Sarkomen treten bald nach der Operation auf, gewöhnlich schon im ersten Jahr. Im zweiten Jahr sind sie sehr selten und danach nur ganz vereinzelt beobachtet worden. Auch die lokalen Rezidive zeigen sich meist bald nach der Operation.

Wie aus den vorher veröffentlichten Krankengeschichten hervorgeht, haben wir durch rein konservativ-chirurgische Behandlung bei einigen Kranken durchaus zufriedenstellende Resultate erzielt. Bei den anderen Kranken, bei denen Metastasen oder Rezidive aufgetreten sind, haben wir die radikale Operation anschließen müssen.

Die konservativen Operationsmethoden haben alle das Gemeinsame, daß sie das vom Tumor befallene Glied zu erhalten suchen. Es ist nun zu unterscheiden zwischen Fällen, in denen man eine dünne Spange des erkrankten Knochens stehen lassen und so dessen Kontinuität erhalten kann und solchen, in denen ein Stück des Knochens vollständig entfernt und so eine Kontinuitätsrefektion vorgenommen werden muß. Bei Tumoren mit beschränkter Ausdehnung kann man sich durch eine Ausschneidung oder Auslöfflung mit nachfolgender Verätzung des Geschwulstlagers begnügen. Bei fortgeschrittenen Fällen oder bei solchen, in denen eine Abgrenzung des Tumors nicht möglich ist, ist die Refektion des befallenen Knochens unbedingt als die Methode der Wahl zu bezeichnen. Man muß dann auch wieder zwischen zwei Verfahren unterscheiden, zwischen denen, die sich darauf beschränken, die nach der Entfernung des erkrankten Knochenstückes zurückbleibenden Enden miteinander zu verheilen und denjenigen, die die durch die Refektion entstandene Knochenlücke sofort wieder ersetzen. Die erstgenannte Gruppe besitzt heute eigentlich nur noch historisches Interesse, da bei diesen Verfahren meistens eine beträchtliche Verkürzung der Extremität stattfinden mußte. Heute richtet der Chirurg sein Augenmerk darauf, jede durch eine Refektion entstandene Lücke im Knochen irgendwie zu ersetzen.

Man hat früher für derartige Transplantationen häufig totes Material, wie Elfenbeinstifte oder tote ausgekochte Knochen als Ersatz verwendet, jedoch meistens ohne Erfolg, da dieses körperfremde Material fast immer wieder ausgestoßen wird.

Als man dann nach dem Vorbild LEXERS lebenswarme Knochen mit Periost überpflanzte, waren bessere Erfolge zu verzeichnen. Die Autoplastik, die Verwendung von Knochenmaterial, das dem Kranken selbst entnommen ist, hat einen großen Fortschritt für die Operationen gebracht. Es sind von verschiedenen Autoren, wie HAHN, TIETZE, BITTNER, LEXER, BARUCH u. A.,

derartige Verfahren eingeführt worden. So ist man dadurch heute in der Lage, ausgedehnte Kontinuitätsrefektionen auszuführen, ohne daß erhebliche funktionelle und kosmetische Störungen zurückzubleiben brauchen.

Erst in den letzten Jahren hat die Osteoplastik beim Sarkom der langen Röhrenknochen eine ausgedehnte Verwendung erfahren. So sind von Jost schon im Jahre 1914 über 300 Fälle von operativem Knochenersatz an den Gliedmaßen zusammengestellt worden. Als v. Miculicz im Jahre 1895 die konservativ-chirurgische Behandlung empfahl, galt dieses Verfahren unter den Chirurgen nur als seltene Ausnahme. Die Refektion wurde nur selten und in besonders günstigen Fällen versucht, die Amputation galt als das normale Verfahren. Zwar war von einigen Chirurgen wie Bergmann, Neumann schon die Refektion von malignen Knochentumoren ausgeführt worden, es ist jedoch das Verdienst von Miculicz, diesem Verfahren einen breiteren Eingang in die Chirurgie verschafft zu haben. An der oberen Extremität waren Refektionen etwas häufiger ausgeführt worden. Miculicz erwähnt die Fälle von Lucas, Morris, Berkaley, Hill und Volkmann. Er veröffentlichte damals eigene Fälle von Refektionen, und zwar einer Refektion des Radius, einen Fall einer Refektion der Ulna, einen einer Refektion der Tibia und zwei Fälle des Femur. In dem letzten hat er allerdings wegen Verwachsenseins des Tumors mit den Gefäßen die sofortige Amputation angeschlossen. Später sind von Nasse und Rotter Refektionen am Humerus und Femur angeführt worden. Wiefinger hat aus dem Hamburger alten Krankenhaus drei Fälle veröffentlicht, eine Refektion des oberen Drittels des Humerus wegen Rund- und Spindelzellenfarkoms, eine Refektion des unteren Femurteiles und Einpflanzung des Stumpfes in die Tibia wegen eines periofalen Osteochondrosarkoms. In einem dritten Fall rezezierte er das obere Tibiaende ebenfalls wegen eines Chondrosarkoms und heftete Tibia und Femur aneinander. Körte konnte im Jahre 1901 einen Patienten demonstrieren, bei dem er wegen periofalen Spindelzellenfarkom ein großes Stück des Femur rezeziert hatte, und der geheilt entlassen werden konnte. Eine mit Erfolg ausgeführte Refektion am Humerus wegen eines Sarkomrezidivs veröffentlichte Vogel im Jahre 1903.

Von Simon ist eine große Anzahl von erfolgreich ausgeführten Refektionen an langen Röhrenknochen im Jahre 1926 gesammelt worden.

Bei Durchsicht der Literatur aus dem letzten Jahrzehnt fanden wir mehrere von italienischen Chirurgen veröffentlichte Fälle von erfolgreich ausgeführten Resektionen. So ist besonders eine ausgedehnte Resektion der Tibia und Ersatz durch ein Transplantat aus dem Femur zu erwähnen, die Giuseppe Serafini ausgeführt hat. Er erzielte dadurch ein gut gebrauchsfähiges Bein mit elastischer Beweglichkeit im Kniegelenk bei 4 cm Verkürzung. Musto empfiehlt in seiner Lehre der primären Sarkome des Schlüsselbeins bei operablen Fällen totale Entfernung. Franzisko Gentil erzielte durch Resektion von 20 cm Tibia wegen zentralen Sarkoms und Einpflanzung eines Stückes Fibula volle Gebrauchsfähigkeit des Fußes. Bei einer Nachuntersuchung nach 20 Jahren war der Patient noch rezidivfrei.

Auch wir haben nach der Resektionsmethode bei den beiden zuerst erwähnten Kranken die Operation ausführen können. Einige Monate später ist bei ihnen während der ersten Belastungsversuche eine Fraktur des eingesetzten Spans aufgetreten. In solchen Fällen, wo man sicher ein Rezidiv ausschließen kann, wird man weiter konservativ vorgehen. Man wird, wie wir es auch getan haben, durch einen neuen Knochenspan die frakturierte Stelle stützen und erst nach noch längerer Ruhigstellung neue Belastungsversuche anstellen. Ist aber ein Rezidiv aufgetreten, so bleibt eigentlich nur noch die radikale Behandlung, nämlich die Amputation, übrig.

An unserer Klinik haben wir als Übergang zu der verstümmelnden Radikaloperation die sogenannte Umkippplastik angewandt. Ausgehend von der Erwägung, daß bei einer Hüftgelenkexartikulation bei einem Tumor am Oberschenkel der gesunde Fuß und Unterschenkel unnötigerweise mitgeopfert werden, besteht dieses von F. Sauerbruch erdachte Verfahren darin, daß nach Entfernung des Femur der Fuß exartikuliert, der Unterschenkel in einer Drehung von 180 Grad nach oben umgekippt wird, so daß das distale Unterschenkelende in die Hüftgelenkspfanne eingesetzt wird. Die Grundzüge dieser Plastik sind auch von Oehler auf den Arm übertragen worden. Von den oben angeführten Kranken, bei denen später die Umkippplastik ausgeführt wurde, sind 2 kurz nach der Operation zum Exitus gekommen.

Im allgemeinen ist bei der Auswahl der Operationsmethoden der Sarkome der langen Röhrenknochen den mikroskopischen Befunden keine Bedeutung beigelegt. Man hat vielmehr den Standpunkt vertreten, daß die Indikation zur konservativen oder Radikaloperation vom Verhalten des Tumors zur Umgebung abhängt.

Es charakterisiert sich schon häufig die mikroskopische Struktur des Tumors durch sein klinisches Verhalten. So wachsen z. B. die Spindeldellen- und die großen Rundzellentumore langsamer und neigen weniger zu Metastasen. Diese letzteren Formen haben im allgemeinen die günstigste Prognose, und solche Geschwülste sind es auch gewesen, bei denen zuerst empfohlen wurde, die Amputation durch eine Resektion zu ersetzen. König noch ist in allen Fällen für die Amputation eingetreten, indem er darauf hinwies, daß man bei Durchfägungen der Knochen weit außerhalb des Tumors noch in der Markhöhle kranke Herde findet, die man natürlich nur durch ausgedehnte Amputation beseitigen kann. Auch Lexer hat früher noch an dem Grundsatz festgehalten, bei periostalen oder durchgebrochenen myelogenen Sarkomen hoch zu amputieren oder so zu exartikulieren, daß auch alle dazugehörigen Muskelgruppen wegfallen, da das Geschwulstgewebe sehr häufig und sehr frühzeitig sich in die Muskelgefäße verbreitet hat. Durch den letzteren Umstand ist auch das häufige Auftreten von Rezidiven zu erklären. Diese Rezidive sind aber auch nach ausgedehnten Amputationen aufgetreten, und Haberer hat grade in diesem Umstande, daß weder die konservativen, noch die verstümmelnden Operationen sichere Erfolge zeigten, die Berechtigung gesehen, zunächst die konservative Methode zu versuchen.

v. Miculicz hat als Hauptargument für die konservative Methode auch die Tatsache angeführt, daß man für die letztere bei den Kranken viel eher Verständnis findet, als für die Amputation. Ein Patient mit einem Sarkom entschließt sich nicht so leicht zur Amputation eines Gliedes, solange er daselbe ohne erhebliche Schmerzen oder Beschwerden noch gebrauchen kann. Die Erhaltung eines Gliedes, auch wenn es verkürzt oder geschwächt ist, leistet dem Patienten größere Dienste, als die beste Prothese. So kann man ohne Schwierigkeit den operativen Eingriff zu dem Zeitpunkt bestimmen, der viel früher liegt, zu einer Zeit, in welcher die Amputation noch entschieden zurückgewiesen wird. Diese Erfahrung ist von vielen Chirurgen immer wieder bestätigt worden. Dieses psychologische Moment darf vom rein ärztlichen Standpunkt aus nicht außer Acht gelassen werden. Aus eben diesen Erwägungen wird auch an unserer Klinik zunächst so konservativ wie möglich vorgegangen, und erst später evtl. über die Umkipplplastik zur radikalen Methode übergegangen.

Entsteht nach der primären Resektion ein Rezidiv, so kann man den Patienten immer noch zur Entfernung des Gliedes bestimmen. Je frühzeitiger eine Resektion ausgeführt wird, desto unwahrscheinlicher ist auch die Metastasenbildung.

Vogel macht noch im Anschluß an einen mitgeteilten Fall darauf aufmerksam, daß man sich, je proximaler ein Tumor sitzt, desto eher zur Resektion anstatt der Exartikulation oder Amputation entschließen müsse. Je näher ein Tumor an die Grenzen, die von Natur aus für die Operation gesteckt sind, Becken- oder Schultergürtel, heranrücke, desto mehr nähere sich die Resektion, was ihre Wertigkeit als Radikaloperation betreffe, der Exartikulation, und um so schwerer fielen dann ihre anderen Vorzüge gegenüber jenen ins Gewicht, vor allem die größere Bereitwilligkeit des Patienten zur Operation und der große, sowohl funktionelle als auch kosmetische Vorteil, den eine auch nur teilweise erhaltene Extremität vor der besten Prothese biete.

Was die Gebrauchsfähigkeit der Extremität nach Resektion und Amputation betrifft, so sind die Verhältnisse an der oberen bei der Resektion zweifellos günstiger, als an der unteren. Um eine gute Funktion am Bein zu erzielen, muß man darauf bedacht sein, eine ausreichende Stabilität desselben vom Becken bis zum Fuß herzustellen. Sicher spielt auch das Lebensalter der Patienten eine wichtige Rolle bei der Erzielung der festen Konsolidation der Knochenfragmente; denn die noch im lebhafterem Wachstum begriffenen oder zu ausgiebiger regenerativer Tätigkeit fähigen Knochen jugendlicher Personen geben hierfür bessere Aussichten, als die der älteren. Dies haben wir ja auch in den von uns angeführten Fällen bestätigt gefunden.

Herrn Prof. Nissen danke ich ergebenst für die freundliche Überlassung der Arbeit und die Beratung bei der Abfassung derselben.

LITERATUR-VERZEICHNIS

- | | |
|----------------|---|
| Bergmann | Zentralbl. f. Chir. Bd. 91 |
| Garré-Borchard | Lehrbuch der Chirurgie |
| Gentil, F. | Refektion der Tibia und Stielplastik aus der Fibula, Zentrbl. f. Chir. Bd. 47 (Ref.) |
| v. Haberer | Zur Behandlung der Sarkome der langen Röhrenknochen. 77. Versammlung der Naturforscher und Ärzte (1905) |
| Jost | Beiträge zur Osteoplastik an den Extremitäten. Beitr. z. klin. Chir. Bd. 95, Heft 1 |
| König | Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, Sitzung vom 11. Februar 1901 |
| König, F. | Klin. Betrachtungen über die Sarkome Dt. Med. Wo. 14, 1932 |
| Körte | Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, Sitzung vom 11. Februar 1901 |
| Lexer, E. | Die freien Transplantationen (1924) |
| v. Miculicz | Über ausgedehnte Refektionen der langen Röhrenknochen wegen maligner Geschwülste Arch. f. klin. Chir. Bd. 50 (1895) |
| Mufto P. | Beiträge zur Lehre der primären Sarkome der Schlüsselbeine. Zentralbl. f. Chir. Bd. 30 (Ref.) |
| Naffe D. | Langenbeck's Arch. Bd. 39 |
| Rotter | Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, Sitzung vom Januar 1898 |
| Serafini, G. | Refektion des oberen Endes der Tibia und Ersatz durch ein Transplantat aus dem Femur. Zentralbl. f. Chir. Bd. 32 (Ref.) |
| Simon, H. | Die Sarkome (1928) |
| Sommer | Zur Frage der Refektion bei malignen Knochengeschwülsten der unteren Extremität. I. D. Kiel (1904) |
| Vogel | Zur Therapie der Sarkome der langen Röhrenknochen. Dt. Zeitschr. f. Chir. Bd. 70 (1903) |
| Wiefinger | Zur Behandlung der bösartigen Neubildungen an den langen Röhrenknochen. Dt. med. Woch. XXIV, 42 (1898) |

LEBENS LAUF.

Als zweite Tochter des im Jahre 1914 im Kriege
gefallenen Polizei-Oberleutnants Max Schatz und seiner
Ehefrau Flora geb. Cuda wurde ich am 28. Juni 1906
zu Berlin geboren.

Nach Besuch der Staatl. Elisabethoberrealschule und
der Realgymnasialen Studienanstalt der Urfulinen zu
Berlin bestand ich an letzterer Anstalt die Reifeprüfung
am 12. Februar 1925.

Studium in Berlin, Münster Breslau, Berlin.

In Berlin am 27. Juli 1927 das medizinische Vorexamen
bestanden und im Juli 1930 das medizinische Staats-
examen vollendet.

Nach Ableistung des praktischen Jahres an der I.
Med. Klinik der Charité (Geh. Rat H i s) und an der
zweiten Chirurg. Abteilung des Städt. Krankenhauses am
Urban (Prof. G o h r b a n d) wurde ich am 1. August 1931
approbiert.

Vom 1. August bis 15. September 1931 war ich als
Volontärassistentin an der I. Med. Klinik der Charité tätig,
vom 15. September 1931 bis 1. Oktober 1932 an der
Chirurg. Klinik der Charité (Geh. Rat Sauerbruch).

Vom 1. November 1932 bis zu meiner Verheiratung
im Dezember 1933 war ich Assistentärztin am städtischen
Wöchnerinnenheim Hannover.

